

GÉNÉRALITÉS

LE GROUPE CHIROPTÈRES CORSE


Avec 22 espèces observées à ce jour, la Corse est l'île de méditerranée occidentale la plus diversifiée du point de vue des chauves-souris. Toutes les espèces d'Europe sont insectivores (une seule peut dévorer plus de 1000 moustiques par nuit).

Elles sont toutes protégées par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés et les modalités de leur protection en application des articles L. 411-1 à L. 412-1 et R.411-1 à R. 412-7 du code de l'environnement.

La Corse représente une des 4 régions françaises où l'on peut rencontrer le Murin de Capaccini avec des effectifs nationaux estimés à 6000 individus adultes. Le millier d'individus estimés sur l'île se répartit en 5 colonies de reproduction principales (Grotte de Saint-Florent, Mine de Castifau, Grotte de Sagone, Mine de Belgodère, galerie de Sampolo). Cette espèce typiquement cavernicole est tributaire du milieu souterrain, autant pour la période de reproduction que lors de l'hibernation ou du transit.

C'est pourquoi tous les gîtes connus bénéficient d'une protection réglementaire voire physique.

Carte de répartition des gîtes de Murin de Capaccini (en rouge, les colonies de reproduction)



Association créée en 1989, agréée Protection de la Nature, le Groupe Chiroptères Corse étudie et protège les chauves-souris.

<http://www.chauvesouriscorse.fr>
Contacts SOS Chauves-souris : 04.95.47.45.94

chauves.souris.corse@free.fr
delphine.rist@wanadoo.fr

7 bis rue du colonel Feracci
BP 35 20250 CORTE

Un Programme Régional de Conservation des Chiroptères a été mis en place en partenariat avec l'Office de l'Environnement de la Corse et la Direction Régionale de l'Environnement.



LES
**CHAUVES-SOURIS
DE
CORSE**

MURIN DE CAPACCINI

MOLOSSE DE CESTONI - RHINOLOPHE EURYALE
GRAND RHINOLOPHE - PETIT RHINOLOPHE
PIPISTRELLE COMMUNE - PIPISTRELLE PYGMÉE
PIPISTRELLE DE KÜHL - MURIN À OREILLES ÉCHANCRÉES
MURIN À MOUSTACHES - MURIN DU MAGHREB
MURIN DE CAPACCINI - MURIN DE DAUBENTON
MURIN DE BECHSTEIN - MURIN DE NATTERER
NOCTULE DE LEISLER - GRANDE NOCTULE
BARBASTELLE - OREILLARD GRIS - OREILLARD ALPIN
MINIOPTÈRE DE SCHREIBERS - VESPÈRE DE SAVI
SÉROTINE COMMUNE



GROUPE CHIROPTÈRES CORSE



Photos : Y. Peyrard, L. Arthur, GCC
© 2009 GCC

Rhinolophe euryale - Grand Rhinolophe - Pipistrelle commune - Pipistrelle pygmée - Pipistrelle de Kühl - Molosse de C
 Murin à moustaches - Murin du Maghreb - Murin de Capaccini - Murin de Daubenton - Murin de Bechstein - Murin de

LE MURIN DE CAPACCINI

Myotis capaccinii

TERRITOIRES DE CHASSE: AU FIL DE L'EAU...

Avec ses grands pieds, le Murin de Capaccini glane les nombreux insectes émergeant du milieu aquatique (chironomidés, trichoptères et lépidoptères principalement). Cette chauve-souris parcourt les rivières, fleuves, retenues d'eau, barrages, étangs lagunaires, parfois jusqu'à plus de 50 km de son gîte (entre les mines de Castifau et l'étang de Biguglia), pouvant même passer des cols. Les individus suivis par télémétrie à partir des principales colonies de reproduction semblent exploiter une grande partie du réseau hydrographique de l'île jusqu'à une altitude de 670 m.

REPRODUCTION: UNE CAVITÉ BIEN CHAUDE

Les Murins de Capaccini se rassemblent dans leur gîte de reproduction assez tardivement, à la fin avril, soit moins d'un mois avant le début des mises bas. Les naissances chez cette espèce sont effectivement les plus précoces, avec les premiers nouveaux-nés visibles au sein des colonies denses de Minioptères de Schreibers, Rhinolophes euryale et Murins du Maghreb.



HIBERNATION: ENCORE DES GROTTES

Aucun gîte d'hibernation n'est connu en Corse pour le murin de Capaccini. L'accouplement a lieu à l'automne dans les gîtes de transit (mine d'Olmeta di Tuda et galerie de Furiani) qui sont délaissés début décembre. On ne retrouve que quelques individus dans les mêmes gîtes d'hibernation que les minioptères de Schreibers, le reste de la population est sans doute dispersé dans des fissures de cavités.



Transit printanier

Reproduction

Transit automnal

Hibernation

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév
passage dans les gîtes de transit	regroupement dans des cavités chaudes	les femelles mettent bas leur unique petit de l'année dès la fin du mois de mai				rassemblement dans les gîtes de transit où auront lieu les accouplements			aucun gîte d'hibernation n'est connu à ce jour en Corse, quelques individus en fissure seulement	